



Geoquímica Industrial IBCER, S.A. de C.V.
Carr. Internacional Km 1619.5, Zona Industrial,
Los Mochis, Sin. México.
Tel. +52 (668) 815 6486
www.ibcer.com

EMERGION Mejorador de Suelos Especificaciones de uso



FORMA DE APLICACIÓN:

EMERGION Por ser un producto soluble en agua, se puede aplicar en todos los sistemas de riego (goteo, aspersión, microaspersión, rodado, etc.) De acuerdo a la dosis recomendada, se calcula la cantidad a aplicar, en función del flujo (gasto de riego) y la superficie a cubrir.

Composición	%
Acidos Carboxílicos	33.4
Acido Lignosulfónico	7.8



Dosis Recomendada por hectárea:

Cultivo	Lt / ha	Epoca de aplicación
Hortalizas, cucurbitáceas, Espárragos	20 a 30 por temporada en 6 a 7 aplicaciones	Aplicar 15 a 20 L/ha hasta 15 días antes de inicio de corte. Aplicar 5 a 15 L/ha durante cortes
Tubérculos, col, brócoli, lechuga Cebolla, ajo, caña de azúcar	15 a 25 por temporada en 4 a 5 aplicaciones	Distribuir aplicaciones durante el ciclo. Realizar última aplicación 15 a 20 días antes fin de ciclo.
Granos, oleaginosas	5 a 15 por temporada en 2 aplicaciones	1 era aplicación: presiembra o en 1er riego. 2da aplicación: 20 a 30 días después.
Frutales, uva, nogal	15 a 25 por temporada en 4 a 6 aplicaciones	Distribuir aplicaciones durante el ciclo. Realizar última aplicación 15 a 20 días antes del fin de ciclo.
Alfalfa	3 a 5 en el riego	Después de cada 3er corte.
Algodón	12 a 15 por temporada en 2 a 3 aplicaciones	1era aplicación: 7 L/ha en riego de germinación. Siguiete aplicación en 1er y 2do riego de auxilio.
Fresa	30 a 40 por temporada	Aplicar 4 L/ha cada 20 días, durante el desarrollo de la planta. En período de cortes aplicar 2 L/ha cada 15 días.

Aplicar 10 -15 L/ha en presiembra, si los problemas de compactación, salinidad y germinación son mayores

* Una vez diluido el producto en agua, aplíquese sin demora; la estancia prolongada en agua puede descomponer la formulación. No mezclar con otros fertilizantes sin hacer antes prueba de premezcla.